

< 福山市で行う定期予防接種一覧表 >

□ 対象年齢 [← 対象年齢のうち、接種を受けるのが望ましい時期]

2017年(平成29年)4月作成

ワクチン	生後 2 3 4 5 6 7 8 か か か か か か か 月 月 月 月 月 月 月 90 か 月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳	対象年齢 (対象年齢内の接種は無料です)	望ましい時期	間 隔	回数	
BCG (結核)		1歳に至るまで	生後5か月から 8か月に至るまで	-	1回	
B型肝炎		1回目 2回目 3回目	1歳に至るまで 生後2か月から9か月に 至るまで	- 1回目終了後、27日以上の間隔をおく 1回目終了後、139日以上の間隔をおく	1回 1回 1回	
Hib (ヒブ)	初回・追加 	初回 追加	接種開始が 生後2か月から 7か月に至るまで 生後2か月から 60か月に至るまで	27日以上(標準的には56日まで)の間隔をおく (生後12か月までに3回接種) 初回終了後、7か月以上 (標準的には13か月まで)の間隔をおく	3回 1回	
小児用肺炎球菌	初回・追加 	初回 追加	接種開始が 生後2か月から 7か月に至るまで 生後2か月から 60か月に至るまで	27日以上の間隔をおく (標準的には生後12か月までに3回接種) 初回終了後、60日以上の間隔をおく (生後12か月以降に行うこと)	3回 1回	
4種混合 (ジフテリア 百日せき ポリオ 破傷風)	1期初回・1期追加 	1期初回 1期追加	生後3か月から 12か月に至るまで 生後3か月から 90か月に至るまで	20日以上(標準的には56日まで)の間隔をおく 1期初回終了後、6か月以上の間隔をおく	3回 1回	
2種混合 (ジフテリア・破傷風)	2期 	2期	11歳以上13歳未満	11歳	-	1回
麻しん風しん混合 麻しん(単独) 風しん(単独)	1期 2期 	1期 2期	生後12か月から 24か月に至るまで 5歳以上7歳未満で、 小学校就学前の1年間	-	-	1回 1回
水痘 (水ぼうそう)	1回目・2回目 	1回目 2回目	生後12か月から 36か月に至るまで	生後12か月から 15か月に至るまで 1回目終了後6か月から 12か月に至るまで	- 1回目終了後、3か月以上の間隔をおく	1回 1回
日本脳炎	1期初回・1期追加 2期 	1期初回 1期追加 2期	生後6か月から 90か月に至るまで 9歳以上13歳未満	3歳 4歳 9歳	6日以上(標準的には28日まで)の間隔をおく 1期初回終了後、6か月以上 (標準的にはおおむね1年)の間隔をおく	2回 1回 1回
子宮頸がん予防 (ヒトパピローマウイルス 感染症)		小学6年生~高校1年生 相当の女子	中学1年生	<2価ワクチン>2回目は、1回目の接種後1か月の間隔をおく <4価ワクチン>2回目は、1回目の接種後2か月の間隔をおく <2価・4価>3回目は、1回目の接種後6か月の間隔をおく	3回	

※接種間隔を6日間以上あける場合は、接種した日から次の接種を行う日までの間隔を6日間以上おきます。例えば4月1日に接種した場合は、4月8日から接種可能です。

※年齢の計算について、対象年齢の「生後3か月から90か月に至るまで」とは、4月1日生まれの人であれば6月30日から7年後の9月30日までの接種が可能であり、「11歳以上13歳未満」とは、11歳の誕生日の前日から13歳の誕生日の前日までの接種が可能です。